



ЕДВД. Е. МАНА.



Pl 466. Schaeffer, Jacobi C.
~~Schaeffer~~ (Schaeffer, Jacobi C.

Icones insectorum circa

Ratisbonae, 1791

3vii. 2



MBL/WHOI

0 0301 0049605 5



54 12
IACOBI CHRISTIANI SHAEFFERI

S. S. THEOLOGIAE ET PHILOSOPHIAE DOCTORIS
ECCLES. EVANGEL. RATISBON. PASTORIS ET SUPERINTENDENTIS
VEN. CONSIST. ASSESS. PRIMARI
SER. AC. POTENT. REGI DANIAE NORVEGIAE A CONSILIIS AC PROFESSORIS
ACADEM. IMP. NATVR. CVRIOS. PETROPOL. LOND. BEROL. VPSAL.
ROBOR. MONACH. ET MANHEM.
SOC. LITT. DVISE. HIST. GOETT. BOTAN. FLORENT. PATRIOT. SVECIC.
PHYSIOGRAPH. LVNDINENS. GOTHOR.
OEC. CELL. BERN. LVSAT. STYR. BVRGHVS. AC PLVR. TEVTON. MEMBRI
ACADEM. SCIENT. PARISIENS. AB EPISTOLARVM COMMERCIO

ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLV MEN PRIMVM.


Natürlich ausgemahlte
Abbildungen
Regensburgischer
Infecten.

Erster Band.

RATISBONAE

TYPIS ZEITLERIANIS. MDCCLXXXI.

1791



**INSECTA
RATISBONENSIA**

VOL. I

**Regensburgische
Insecten.**

Erster Band.

TABVLA I.

Erste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX PRIMVS.
Erster Holzkäfer.
- Fig. II. COCCINELLA PRIMA.
Erster Blattlauskäfer.
- Fig. III. CHRYSOMELA PRIMA.
Erster Blattkäfer.
- Fig. IV. SARABAEVS *tribus antennarum lamellis* PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis alis planis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* PRIMVS.
Erster Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. VIII. IX. SPHINX *alis integris cauda simplici* PRIMA.
Erster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. X. ICHNEVMON PRIMVS.
Erste Schlupfwespe.
- Fig. XI. a. b. CVRCVLIO *femoribus dentatis* PRIMVS.
Erster Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. a. b. CVRCVLIO *femoribus dentatis* SECVNDVS.
Zweiter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XIII. CARABVS. *ouatus* PRIMVS.
Erster eyrunder Laufkäfer.



52421

TABVLA II.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. IIX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI



TABVLA II.

Zweyte Tafel.

- Fig. I. **BVPRESTIS** PRIMA.
Erster Stinkkäfer.
- Fig. II. **STAPHYLINVS** PRIMVS.
Erster Raubkäfer.
- Fig. III. **CIMEX** *quinque antennarum articulis* PRIMVS.
Erste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. **LIBELLVLA** *alis patentibus* PRIMA.
Erstes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. **ELATER** *antennis pectinatis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VI. **ELATER** *antennis pectinatis* SECUNDVS.
Zweyter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. **LEPTVRA** *thorace globoso* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VIII. **LEPTVRA** *thorace globoso* SECUNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. **LEPTVRA** *thorace globoso* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. **STENOCORVS** *thorace armato* PRIMVS.
Erster Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. XI. **CVRCVLIO** *femoribus muticis* PRIMVS.
Erster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. **CVRCVLIO** *femoribus muticis* SECUNDVS.
Zweyter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA III.

Dritte Tafel.

- Fig. I. CARABVS oblongus PRIMVS. *violaceus*
Erster länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS ~~länglicher Laufkäfer~~ *convexus* / oblongus SECUNDVS
Zweyter oblongus ~~SECUNDVS~~ / länglicher Laufkäfer
- Fig. III. DYTICVS PRIMVS.
Erster Schwimmkäfer.
- Fig. IV. CHRYSOMELA SECUNDA
Zweyter Blattkäfer.
- Fig. V. MELOE PRIMVS.
Erster Mayenwurmkäfer!
- Fig. VI. MELOE SECUNDVS.
Zweyter Mayenwurmkäfer.
- Fig. VII. COPRIS muticus PRIMVS.
Erster ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VIII. COPRIS muticus SECUNDVS.
Zweyter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IX. ATTELABVS PRIMVS. *2 maculatus*
Erster Schildkrötenkäfer.
- Fig. X.XI.XII. PHRYGANEA PRIMA.
Erste Frühlingsfliege.
- Fig. XIII. STENOCORVS thorace inermi SECUNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

Als Fig. II CARABVS oblongus SECUNDVS.
Zweyter länglicher Laufkäfer.

TABULA III.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. IIX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



TABVLA IV.

Fig. II.




Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. II X.



Fig. VII.



Fig. IX.




Fig. XI.



Fig. X.




Fig. XII.



Fig. XIV.



Fig. XIII.



Tabula IV.

Vierte Tafel.

- Fig. I. LIBELLULA alis patentibus SECUNDA.
Zweytes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. LEPTVRA thorace globoso QUARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace globoso QUINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IV. CRIOCERIS PRIMA.
Erster Lilienkäfer.
- Fig. V. CRIOCERIS SECUNDA.
Zweyter Lilienkäfer.
- Fig. VI. ELATER antennis serratis PRIMVS.
Erster Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis serratis SECUNDVS.
Zweyter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. CICINDELA PRIMA.
Erster Zangenkäfer.
- Fig. IX. X. VROCERVS PRIMVS.
Erste Schwanzfliege.
- Fig. XI. STAPHYLINVS SECUNDVS.
Zweyter Raubkäfer.
- Fig. XII. LEPTVRA thorace plano PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIII. LEPTVRA thorace plano SECUNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIV. TETIGONIA PRIMA.
Erste Singfliege.

/n /k

TABVLA V.

Fünfte Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SECUNDVS. *Stercorarius*.
Zweyter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. ICHNEVMON SECUNDVS.
Zweyte Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. FORMICA PRIMA. FEMINA ET MAS.
Erste Ameise. Weibgen und Männchen.
- Fig. V. VI. HEPA PRIMA.
Erster Wafferfcorpion.
- Fig. VII. VIII. HEMEROBIVS PRIMVS.
Erster Blattlauslöwe.
- Fig. IX. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis SECUNDVS.
Zweyte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis TERTIVS.
Dritte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA VI.

Sechste Tafel.

- Fig. I. MELOLONTHA PRIMA.
Erster Sägenblattkäfer.
- Fig. II. MELOLONTHA SECUNDA.
Zweyter Sägenblattkäfer.
- Fig. III. MELOLONTHA TERTIA.
Dritter Sägenblattkäfer.
- Fig. IV. RHINOMACER PRIMVS.
Erster Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. LIBELLVLA alis patentibus TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. VI. VII. MELOLONTHA QVARTA.
Vierter Sägenblattkäfer.
- Fig. VIII. PLATYCERVVS PRIMVS.
Erster Kammkäfer.
- Fig. IX. STENOCORVS thorace inermi TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. X. LIBELLVLA alis patentibus QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. XI. ICHNEVMON TERTIVS.
Dritte Schlupfwespe.
- Fig. XII. ICHNEVMON QVARTVS.
Vierte Schlupfwespe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON QVINTVS.
Fünfte Schlupfwespe.

TABVLA VII.

Siebende Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris PRIMVS.*
Erster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln. *M*
- Fig. III. *TENTHREDO antennis clauatis PRIMA.*
Erste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *TENTHREDO antennis clauatis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *TENTHREDO antennis clauatis TERTIA.*
Dritte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *TENTHREDO antennis filiformibus PRIMA.*
Erste Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *TENTHREDO antennis pectinatis PRIMA.*
Erste Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *TENTHREDO antennis clauatis QUARTA.*
Vierte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis clauatis QUINTA.*
Fünfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *TENTHREDO antennis setaceis PRIMA.*
Erste Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *TENTHREDO antennis setaceis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *TENTHREDO antennis filiformibus SECUNDA.*
Zweyte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

M Flügeln.

TABULA VII.

Fig. III.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. X.



Fig. V.



Fig. II.




Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA VIII.





Fig. XIII.



TABVLA VIII.

Achte Tafel.

- Fig. I. TABANVS PRIMVS.
Erste Bremsenfliege.
- Fig. II. STENOCORVS thorace armato SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace armato TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV. V. VI. TABANVS SECVNDVS.
Zweyte Bremsenfliege.
- Fig. VII. DYTICVS SECVNDVS.
Zweyter Schwimmkäfer.
- Fig. VIII. DYTICVS TERTIVS.
Dritter Schwimmkäfer.
- Fig. IX. DYTICVS QVARTVS.
Vierter Schwimmkäfer.
- Fig. X. DYTICVS QVINTVS.
Fünfter Schwimmkäfer.
- Fig. XI. ASILVS PRIMVS.
Erste Raubfliege.
- Fig. XII. ASILVS SECVNDVS.
Zweyte Raubfliege.
- Fig. XIII. ASILVS TERTIVS.
Dritte Raubfliege.
- Fig. IV. ASILVS QVARTVS.
Vierte Raubfliege.
- Fig. XV. ASILVS QVINTVS.
Fünfte Raubfliege.

TABVLA IX.

Neunte Tafel.

- Fig. I. PRIONVS PRIMVS.
Erster Sägenholzkäfer.
- Fig. II. III. HEMEROBIVS SECVNDVS.
Zweyter Blattlauslöwe.
- Fig. IV. SILPHA PRIMA.
Erster Aaskäfer.
- Fig. V. VI. EPHEMERA PRIMA.
Erste Uferaasfliege.
- Fig. VII. COCCINELLA SECVNDA.
Zweyter Blattlauskäfer.
- Fig. VIII. COCCINELLA TERTIA.
Dritter Blattlauskäfer.
- Fig. IX. COCCINELLA QVARTA.
Vierter Blattlauskäfer.
- Fig. X. COCCINELLA QVINTA.
Fünfter Blattlauskäfer.
- Fig. XI. COCCINELLA SEXTA.
Sechster Blattlauskäfer.
- Fig. XII. COCCINELLA SEPTIMA.
Siebender Blattlauskäfer.
- Fig. XIII. LIBELLVLA alis patentibus QVINTA.
Fünftes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. XIV. XV. PHALAENA feticornis alis planis SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA IX.



Fig. I.











Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA X.
Zehende Tafel.

Fig. I. CERAMBYX SECUNDVS.
Zweyter Holzkäfer.

Fig. II. III. VROCERVS SECUNDVS.
Zweyte Schwanzfliege.

Fig. IV. V. VOLVCELLA PRIMA.
Erste Federbuschfliege.

Fig. VI. VOLVCELLA SECUNDA.
Zweyte Federbuschfliege.

Fig. VII. VOLVCELLA TERTIA.
Dritte Federbuschfliege.

Fig. VIII. VOLVCELLA QVARTA.
Vierte Federbuschfliege.

Fig. IX. VOLVCELLA QVINTA.
Fünfte Federbuschfliege.

Fig. X. XI. NECYDALIS PRIMVS.
Erster Fliegenkäfer.

TABVLA XI.

Eilfte Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* TERTIVS. *cephalotes*
Dritter länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* QVARTVS. *hortensis*
Vierter länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. CRABRO PRIMVS.
Erste Kolbenfliege.
- Fig. IV. CRABRO SECVNDVS.
Zweyte Kolbenfliege.
- Fig. V. VI. HIPPOBOSCA PRIMA.
Erste Pferdfliege.
- Fig. VII. CERAMBYX TERTIVS.
Dritter Holzkäfer.
- Fig. VIII. ELATER *antennis ferratis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. ELATER *antennis ferratis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. XII. CIMEX *quinque antennarum articulis* QVARTVS.
Vierte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XIII. CARABVS *ouatus* SECVNDVS. *Crepitans*
Zweyter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XIV. CARABVS *ouatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. CIMEX *quatuor antennarum articulis* PRIMVS.
XVII. Erste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA XI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. X.



Fig. XIV.



Fig. XIII.



Fig. XVI.



Fig. XVII.



Fig. XV.



TABVLA XII.

Z w ö l f t e T a f e l

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. IX. LIBELLVLA alis *erectis* PRIMA.
Erstes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.
- Fig. X. NEMOTELVS PRIMVS.
Erste Stiletfliege.
- Fig. XI. NEMOTELVS SECUNDVS.
Zweyte Stiletfliege.
- Fig. XIII. NEMOTELVS TERTIVS.
Dritte Stiletfliege.

TABVLA XIII.

Dreyzehende Tafel.

- Fig. I. *CIMEX quatuor antennarum articulis SECUNDVS.*
Zweyte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. *CIMEX quatuor antennarum articulis TERTIVS.*
Dritte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quatuor antennarum articulis QVARTVS.*
Vierte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis QVINTVS.*
Fünfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis SEXTVS.*
Sechste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis SEPTIMVS.*
Siebende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *CIMEX quatuor antennarum articulis OCTAVVS.*
Achte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quatuor antennarum articulis NONVS.*
Neunte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS.*
Zehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quatuor antennarum articulis VNDECIMVS.*
Eilfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DVODECIMVS.*
Zwölfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA XIV.

Vierzehende Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis* PRIMVS.
Erster Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III. IV. *ONISCVS* PRIMVS.
Erste Affel.

Fig. V. VI. *ONISCVS* SECVNDVS.
Zweyte Affel.

Fig. VII. *CERAMBYX* QVARTVS.
Vierter Holzkäfer.

Fig. VIII. *CERAMBYX* QVINTVS.
Fünfter Holzkäfer.

Fig. IX. *CERAMBYX* SEXTVS.
Sechster Holzkäfer.

Fig. X. *STRATIOMYS* PRIMA.
Erste Waffenfliche.

Fig. XI. *STRATIOMYS* SECVNDA.
Zweyte Waffenfliche.

Fig. XII. XIII. *STRATIOMIS* TERTIA.
Dritte Waffenfliche.

Fig. XIV. *STRATIOMYS* QVARTA.
Vierte Waffenfliche.

Fig. XV. *STRATIOMYS* QVINTA.
Fünfte Waffenfliche.

TABVLA XV.

Funfzehende Tafel.

BIBIO PRIMVS.

Fig. I. II.

Erste Marcusfliege.

Fig. III.

TIPVLA alis patentibus PRIMA. MAS.

Erste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.

Fig. IV.

TIPVLA alis patentibus SECUNDA. FEMINA.

Zweyte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. V.

TIPVLA alis patentibus TERTIA.

Dritte Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. VI.

TIPVLA alis patentibus QVARTA.

Vierte Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. VII.

TIPVLA alis patentibus QVINTA.

Fünfte Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. VIII.

TIPVLA alis patentibus SEXTA.




Sechste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. IX.

TIPVLA alis patentibus SEPTIMA.

Siebende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABULA XVI.



TABVLA XVI.

Sechzehende Tafel.

- Fig. I. SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* *barbosa* PRIMÆ.
Erster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem oder bärtigem Schwanze.
- Fig. II. III. SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* SECVNDÆ.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.
- Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* SECVNDÆ.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VIII. TELEPHORVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. IX. TELEPHORVS *oblongus* SECVNDVS.
Zweyter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. X. TELEPHORVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XI. TELEPHORVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XII. TELEPHORVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIII. TELEPHORVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIV. TELEPHORVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XV. TELEPHORVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Warzenkäfer.

TABVLA XVII.

Siebenzehende Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis patentibus PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis patentibus SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis patentibus QUINTA.
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum truncata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum truncata* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VI. ASILVS SEXTVS.
Sechste Raubfliege.
- Fig. VII. ASILVS SEPTIMVS.
Siebende Raubfliege.
- Fig. VIII. IX. MVSCA *spathula antennarum rotunda* PRIMA.
Erste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. X.



Fig. IX.



TABVLA XVIII.

Achtzehende Tafel.

Fig. I. CARABVS oblongus QVINTVS.
Fünfter länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS oblongus SEXTVS.
Sechster länglicher Laufkäfer.

leucophthalmus; vulgar

Fig. III. CARABVS oblongus SEPTIMVS.
Siebender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. CARABVS oblongus OCTAVVS.
Achter länglicher Laufkäfer.

Fig. V. CARABVS oblongus NONVS.
Neunter länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. CARABVS oblongus DECIMVS.
Zehender länglicher Laufkäfer.

granulatus

Fig. VII. CARABVS oblongus VNDECIMVS.
Eilfter länglicher Laufkäfer.

Fig. VIII. CARABVS ouatus QVARTVS.
Vierter eyrunder Laufkäfer.

Fig. IX. CARABVS oblongus DVODECIMVS.
Zwölfter länglicher Laufkäfer.

piceus

Fig. X. XI. TELEPHORVS ouatus PRIMVS.
Erster eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XII. XIII. TELEPHORVS ouatus SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XIV. TELEPHORVS ouatus TERTIVS.
Dritter eyrunder Warzenkäfer.

TABVLA XIX.

Neunzehende Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis *serratis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER antennis *setaceis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. ELATER antennis *serratis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ELATER antennis *serratis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. ELATER antennis *setaceis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. ELATER antennis *setaceis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. IX. ARANEA oculorum situ *quadrato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. X. ARANEA oculorum situ *quadrato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XI. ARANEA oculorum situ *quadrato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XII. ARANEA oculorum situ *quadrato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. XIV. XV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. XVI. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Tabula XX.


Zwanzigste Tafel.

- Fig. I. STAPYLINVS TERTIVS.
Dritter Raubkäfer.
- Fig. II. III. ICHNEVMON SEXTVS.
Sechste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. ICHNEVMON SEPTIMVS.
Siebende Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON OCTAVVS.
Achte Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON NONVS.
Neunte Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON DECIMVS.
Zehende Schlupfwespe.
- Fig. IX. ICHNEVMON VNDECIMVS.
Elfte Schlupfwespe.
- Fig. X. ICHNEVMON DVODECIMVS.
Zwölfte Schlupfwespe.
- Fig. XI. ICHNEVMON DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Schlupfwespe.
- Fig. XII. ICHNEVMON DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Schlupfwespe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Schlupfwespe.
- Fig. XIV. ICHNEVMON DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Schlupfwespe.

TABVLA XXI.

Ein und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. *CHRYSOMELA TERTIA.*
Dritter Blattkäfer.
- Fig. III. *CHRYSOMELA QUARTA.*
Vierter Blattkäfer.
- Fig. IV. *CHRYSOMELA QUINTA.*
Fünfter Blattkäfer.
- Fig. V. *CHRYSOMELA SEXTA.*
Sechster Blattkäfer.
- Fig. VI. *CHRYSOMELA SEPTIMA.*
Siebender Blattkäfer.
- Fig. VII. *CHRYSOMELA OCTAVA.*
Achter Blattkäfer.
- Fig. VIII. *CHRYSOMELA NONA.*
Neunter Blattkäfer.
- Fig. IX. *CHRYSOMELA DECIMA.*
Zehender Blattkäfer.
- Fig. X. *CHRYSOMELA VNDECIMA.*
Eilfter Blattkäfer.
- Fig. XI. *CHRYSOMELA DVODECIMA.*
Zwölfter Blattkäfer.
- Fig. XII. *CHRYSOMELA DECIMA TERTIA.*
Dreizehender Blattkäfer.
- Fig. XIII. *CHRYSOMELA DECIMA QUARTA.*
Vierzehender Blattkäfer.
- Fig. XIV. *CHRYSOMELA DECIMA QUINTA.*
Fünfzehender Blattkäfer.
- Fig. XV. *CHRYSOMELA DECIMA SEXTA.*
Sechzehender Blattkäfer.
- Fig. XVI. *CHRYSOMELA DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Blattkäfer.
- Fig. XVII. *CHRYSOMELA DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Blattkäfer.
- Fig. XVIII. *CHRYSOMELA DECIMA NONA.*
Neunzehender Blattkäfer.
- Fig. XIX. *CHRYSOMELA VICESIMA.*
Zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. XX. *CHRYSOMELA VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigster Blattkäfer.



TABVLA XXII.
Zwey und zwanzigste Tafel

Fig. I. II. FORMICALEO PRIMVS.
Erster Ameisenlöwe.

Fig. III. IV. APIS PRIMA.
Erste Biene.

Fig. V. VI. APIS SECVNDA.
Zweyte Biene.

Fig. VII. APIS TERTIA.
VIII. IX. *Dritte Biene.*

Fig. X. XI. APIS QVARTA.
Vierte Biene.

Fig. XII. XIII. APIS QVINTA.
Fünfte Biene.

Fig. XIV. APIS SEXTA.
Sechste Biene.

Fig. XV. APIS SEPTIMA.
Siebende Biene.

Fig. XVI. APIS OCTAVA.
Achte Biene.

TABVLA XXIII.

Drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit sieben-spaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVARTVS.
Vierter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVINTVS.
Fünfter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEXTVS.
Sechster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEPTIMVS.
Siebender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis OCTAVVS.
Achter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis NONVS.
Neunter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS.
Zehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. IX.




Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



TABVLA XXIV.

Vier und zwanzigste Taf

Fig. I. *TELEPHORVS oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Warzenkäfer.

Fig. II. *VESPA PRIMA.*
Erste Wespe.

Fig. III. *VESPA SECVNDA.*
Zweyte Wespe.

Fig. IV. *VESPA TERTIA.*
Dritte Wespe.

Fig. V. *VESPA QVARTA.*
Vierte Wespe.

Fig. VI. VII. *PHALAENA seticornis alis deflexis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VIII. IX. *PHALAENA peñtinicornis alis deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. X. XI. *PHALAENA seticornis alis planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA XXV.

Fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *dentatis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEPTIMVS.
Siebender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* OCTAVVS.
Achter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA XXVI.

Sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VNDECIMVS.
Eilfter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DVODECIMVS.
Zwölfter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS OCTAVVS.
conspicatus
Achtzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS NONVS.
Neunzehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

TABVLA XXVII.

Sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. a. b. ACARVS PRIMVS.
Erste Milbe.

Fig. II. a. b. ACARVS SECVNDVS.
Zweyte Milbe.

Fig. III. a. b. c. ACARVS TERTIVS.
Dritte Milbe.

Fig. IV. a. b. CASSIDA PRIMA.
Erster Schildkäfer.

Fig. V. CASSIDA SECVNDA.
Zweyter Schildkäfer.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM PRIMVM.
Erste Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. IX. ACRIDIVM SECVNDVM.
Zweyte Schnarrheuschrecke.

Fig. X. XI. ACRIDIVM TERTIVM.
Dritte Schnarrheuschrecke.



Fig. I.




Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.




Fig. III.



Fig. VIII.




Fig. VII.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



TABVLA XXVIII.
Acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *seticornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Tabula XXIX.
Neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* PRIMVS.
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.
- Fig. V. VI. PAPILIO *hexap^{is}* alis *caudatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. IX. X. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammen gerollten* Flügeln.

Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. VIII.





TABVLA XXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVI.



Fig. XVII.



TABVLA XXX.

Dreyfsigfte Tafel.

- | | |
|------------|--|
| Fig. I. | CRYPTOCEPHALVS PRIMVS.
<i>Erster Fallkäfer</i> |
| Fig. II. | CRYPTOCEPHALVS SECVNDVS.
<i>Zweyter Fallkäfer.</i> |
| Fig. III. | CRYPTOCEPHALVS TERTIVS.
<i>Dritter Fallkäfer.</i> |
| Fig. IV. | CRYPTOCEPHALVS QVARTVS.
<i>Vierter Fallkäfer.</i> |
| Fig. V. | CRYPTOCEPHALVS QVINTVS.
<i>Fünfter Fallkäfer.</i> |
| Fig. VI. | CRYPTOCEPHALVS SEXTVS.
<i>Sechster Fallkäfer.</i> |
| Fig. VII. | CRYPTOCEPHALVS SEPTIMVS.
<i>Siebender Fallkäfer.</i> |
| Fig. VIII. | CRYPTOCEPHALVS OCTAVVS.
<i>Achter Fallkäfer.</i> |
| Fig. IX. | COCCINELLA OCTAVA.
<i>Achter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. X. | COCCINELLA NONA.
<i>Neunter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XI. | COCCINELLA DECIMA.
<i>Zehender Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XII. | COCCINELLA VNDECIMA.
<i>Eilfter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XIII. | COCCINELLA DVODECIMA.
<i>Zwölfter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XIV. | COCCINELLA DECIMA TERTIA.
<i>Dreyzehender Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XV. | COCCINELLA DECIMA QVARTA.
<i>Vierzehender Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XVI. | COCCINELLA DECIMA QVINTA.
<i>Fünfzehender Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XVII. | COCCINELLA DECIMA SEXTA.
<i>Sechzehender Blattlauskäfer.</i> |

TABVLA XXXI.

Ein und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis *serratis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER antennis *serratis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. ELATER antennis *serratis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ELATER antennis *pectinatis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.
- Fig. V. ELATER antennis *setaceis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. ELATER antennis *serratis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. XII. BVPRESTIS SECUNDA.
Zweyter Stinkkäfer.
- Fig. XIII. CARABVS *ouatus* QVINTVS.
Fünfter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XIV. ARANEA oculorum situ *semilunato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. VIII.




Fig. V.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XIV.




Fig. XII.



Fig. XII.







TABVLA XXXII.

Zwey und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus OCTAVA.
Achte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS NONA.
Neunte Biene.
- Fig. III. APIS DECIMA.
Zehende Biene.
- Fig. IV. APIS VNDECIMA.
Eilfte Biene.
- Fig. V. APIS DVODECIMA.
Zwölfte Biene.
- Fig. VI. VII. APIS DECIMA TERTIA.
VIII. *Dreyzehende Biene.*
- Fig. IX. X. APIS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Biene.
- Fig. XI. XII. APIS DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Biene.
- Fig. XIII. APIS DECIMA SEXTA.
Sechzehende Biene.
- Fig. XIV. APIS DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Biene.
- Fig. XV. APIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Biene.
- Fig. XVI. APIS DECIMA NONA.
XVII. *Neunzehende Biene.*
- Fig. XVIII. APIS VICESIMA.
Zwanzigste Biene.
- Fig. XIX. APIS VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Biene.
- Fig. XX. ARANEA oculorum situ trium linearum PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in drey Reihen.

TABVLA XXXIII.

Drey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II.

HYDROPHILVS PRIMVS.

Erster Wafferkäfer.

Fig. III. IV.

NAVCORIS PRIMVS.

Erste Afterwanze.

Fig. V. VI.

NOTONECTA PRIMA.

Erste Waffervanze.

Fig. VII. VIII.
IX.


HEPA SECVNDA.

Zweyter Wafferscorpion.

Fig. X.

HYDROPHILVS SECVNDVS.

Zweyter Wafferkäfer.



TABVLA XXXIV.

Fig. IV.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. VI.




Fig. VII.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



TABVLA XXXIV.

Vier und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis NONVS.
Neunter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS.
Zehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus muticis VNDECIMVS.
Eilfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CRIOCERIS TERTIA.
Dritter Lilienkäfer.
- Fig. V. LEPTVRA thorace plano TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. VII. PAPILIO hexapus alis integris PRIMVS.
Erfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VIII. CICINDELA SECVNDA.
Zweyter Zangenkäfer.
- Fig. IX. CICINDELA TERTIA.
Dritter Zangenkäfer.
- Fig. X. APIS VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Biene.
- Fig. XI. APIS VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Biene.
- Fig. XII. STENOCORVS thorace inermi QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA XXXV.

Fünf und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. III. *PAPILIO hexapus alis angulatis PRIMVS.*
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit ekigen Flügeln.

Fig. IV. *VESPA QVINTA.*
Fünfte Wespe.

Fig. V. *VESPA SEXTA.*
Sechste Wespe.

Fig. VI. *BVPRESTIS TERTIA.*
Dritter Stinkkäfer.

Fig. VII. *BVPRESTIS QVARTA.*
Vierter Stinkkäfer.

Fig. VIII. *ARANEA oculorum situ semilunato QVARTA.*
Vierte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. IX. *STAPHYLINVS QVARTVS.*
Vierter Raubkäfer.

Fig. X. *CICINDELA QVARTA.*
Vierter Zangenkäfer.

TABVLA XXXVI.

Sechs und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CASSIDA TERTIA.
Dritter Schildkäfer.
- Fig. III. STOMOXOIDES PRIMVS.
Erste Taschenmefferfliege.
- Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. VI. STAPHYLINVS QVINTVS.
Fünfter Raubkäfer.
- Fig. VII. VIII. VOLVCELLA SEXTA.
Sechste Federbuschfliege.
- Fig. IX. X. MVSCA *spathula antennarum oblonga* PRIMA.
Erste Hausfliege mit länglichem Spädel.
- Fig. XI. XII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* SECVNDV.
Zweyte Hausfliege mit rundlichem Spädel.
- Fig. XIII. MELOLONTHA QVINTA.
Fünfter Sägenblattkäfer.
- Fig. XIV. MELOLONTHA SEXTA.
Sechster Sägenblattkäfer.

TABVLA XXXVII.

Sieben und dreißigste Tafel.

- Fig. I. **GRYLLVS PRIMVS.**
Erste Grille.
- Fig. II. III. **PERLA PRIMA.**
Erste Afterfrühlingsfliege.
- Fig. IV. V. **PERLA SECVNDA.**
Zweyte Afterfrühlingsfliege.
- Fig. VI. **TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus PRIMVS.** *mortifera.*
Erster Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. **PHALAENA seticornis alis deflexis QVARTA.**
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IX. X. **PHRYGANEA SECVNDA.**
Zweyte Frühlingsfliege.
- Fig. XI. **ARANEA oculoꝝum situ semilunato QVINTA.**
Fünfte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. XII. **MVSCA spatula antennarum oblonga SECVNDA.**
Zweyte Hausfliege mit länglichem Spädel.
- Fig. XIII. **RHINOMACER SECVNDVS.**
Zweyter Afterrüffelkäfer.

Fig. II.



Fig. IV.




Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.




Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



TABVLA XXXVIII.

Acht und dreyßsigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Schlupfwespe.
- Fig. II. ELATER *antennis pectinatis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA *thorace cylindraceo* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA *thorace cylindraceo* SECUNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA *thorace globoso* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace globoso* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA *thorace globoso* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA *thorace globoso* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis alis deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Tabula XXXIX.

Neun und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. II. LEPTVRA thorace conico PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace conico SECUNDA.
Zweiter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace conico TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace conico QUARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace conico QUINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace conico SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace conico SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace conico OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. X. LEPTVRA thorace conico NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. XI. LEPTVRA thorace conico DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. XII. STAPHYLINVS SEXTVS.
Sechster Raubkäfer.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. XIII.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. IX.



Fig. XI.





LIX ALPHABET. TABVLA XL.

Vierzigste Tafel.

Fig. I. II. **MVSCA** *spathula antennarum oblonga* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit länglichem Spädel.

Fig. III. IV. **PAPILIO** *hexapus alis integris* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. V. VI. **CASSIDA** QVARTA.
Vierter Schildkäfer.

Fig. VII. **PELTIS** PRIMA.
Erster Geißerkäfer.

Fig. VIII. IX. **PAPILIO** *tetrapus alis angulatis* PRIMVS.
Erster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA XLI.

Ein und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. III. *CIMEX quinque antennarum articulis QVINTVS.*
Fünfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.*
Vierzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. *CIMEX quinque antennarum articulis SEXTVS.*
Sechste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. XI. *ICHNEVMON DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Schlupfwespe.
- Fig. XII. XIII. *FORFICVLA PRIMA.*
Erster Ohrkäfer.
- Fig. XIV. *CARABVS ouatus SEXTVS.*
Sechster eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. *TELEPHORVS ouatus QVARTVS.*
Vierter eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XVII. XVIII. *PHALAENA seticornis alis deflexis QVINTA.*
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABULA XLI.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.




Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. XIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XV.



Fig. XIV.



Fig. XVII.



Fig. XVI.



Fig. XVIII.





TABULA XLIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



TABVLA XLII.


Zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. **DERMESTES PRIMVS.**
Erster Speckkäfer.
- Fig. III. **DERMESTES SECVNDVS.**
Zweyter Speckkäfer.
- Fig. IV. **DERMESTES TERTIVS.**
Dritter Speckkäfer.
- Fig. V. VI. **CHRYISIS PRIMA.**
Erste Goldwespe.
- Fig. VII. **EPHEMERA SECVNDA.**
Zweyte Vferaasfliege.
- Fig. VIII. IX. **TENTHREDO antennarum setaceis TERTIA.**
Dritte Sägliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. X. **ATTELABVS SECVNDVS.** *Hifter unicolor*
Zweyter Schildkrötenkäfer.
- Fig. XI. **CIMEX quinque antennarum articulis SEPTIMVS.**
Siebende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. **CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.**
Fünfzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XIII. **ARANEA oculorum situ semilunato SEXTA.**
Sechste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABULA XLIII.

Drey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. ICHNEVMON DECIMVS NONVS.
Neunzehende Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. CIMEX quinque antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON VICESIMVS.
Zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. VIII. CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus muticis DODECIMVS.
Zwölfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA seticornis alis planis SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. XIII. XIV. PHALAENA pectinicornis alis deflexis SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XV. XVI. CIMEX quinque antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.



TABVLA XLIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



VIX ATABVLA XLIV.

Vierund vierzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS QVARTVS
Vierzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CHRYSOMELA VICESIMA SECVNDV.
Zwey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. III. APIS VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Biene.
- Fig. IV. V. PHRYGANEIA TERTIA.
Dritte Frühlingsfliege.
- Fig. VI. LIBELLVLA alis *erectis* SECVNDV.
Zweytes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. VIII. CRABRO TERTIVS.
Dritte Kolbenfliege.
- Fig. IX. X. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XI. ARANEA oculorum situ *quatuor linearum* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in vier Reihen.

VLIX TABVLA XLV.

Heute Fünf und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO hexapus alis caudatis TERTIVS.**
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III. IV. **PAPILIO hexapus alis caudatis QVARTVS.**
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. V. **ELATER antennis pectinatis QVINTVS.**
Fünfter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.

Fig. VI. **APIS VICESIMA QVINTA.**
Fünf und zwanzigste Biene.

Fig. VII. **ICHNEVMON VICESIMVS PRIMVS.**
Ein und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. VII.





Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.




Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



IVIX TABVLA XLVI.

Sechs und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. CIME X *quinque* antennarum articulis DECIMVS.
Zehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. III. CIME X *quinque* antennarum articulis VNDECIMVS.
Eilfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIME X *quinque* antennarum articulis DVODECIMVS.
Zwölfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VI. CIME X *quinque* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CIME X *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. IX. BOMBYLIVS PRIMVS.
Erste Rüsselfliege.

Fig. X. XI. CARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS.
Zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. XII. SCOLOPENDRA PRIMA.
Erster Vielfufs.

IVIX ATAVLA XLVII.

Die sieben und vierzigste Tafel.

- Fig. I. **CANTHARIS PRIMARIA**
Erster Pflasterkäfer.
- Fig. II. III. **PHALAENA feticornis alis deflexis SEPTIMA.**
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. **CHRYSOMELA VICESIMA TERTIA.**
Drey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VI. **STRATIOMYS sexta.**
Sechste Waffenfliege.
- Fig. VII. VIII. **ARANEA oculorum situ semilunato SEPTIMA.**
Siebende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IX. X. **ASILVS OCTAVVS.**
Achte Raubfliege.
- Fig. XI. **CHARABAEVS**
Zehnte Raubfliege.
- Fig. XII. **SCOLYTUS**
Zwölfter Borkkäfer.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



1

2

3

4

TABVLA XLVIII.

Acht und vierzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis erectis TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. LIBELLVLA alis erectis QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. III. LIBELLVLA alis erectis QVINTA.
Fünftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace cylindraceo QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace cylindraceo QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. COCCINELLA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus NONA.
Neunte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VIII. CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. ASILVS NONVS.
Neunte Raubfliege.
- Fig. X. ALILVS DECIMVS.
Zehende Raubfliege.
- Fig. XI. CLERVS PRIMVS.
Erster Bienenkäfer.

TABVLA XLIX.

Neun und vierzigste Tafel

Fig. I. **BVPRESTIS** QVINTA.
Fünfter Stinkkäfer.

Fig. II. III. **STOMOXOIDES** SECUNDVS.
Zweyte Taschenmesserfliege.

Fig. IV. **ICHNEVMON** VICESIMVS SECUNDVS.
Zwey und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. V. **ARANEA** oculorum situ semilunato OCTAVA.
Achte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. VI. **ARANEA** oculorum situ semilunato NONA.
Neunte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. VII. **ARANEA** oculorum situ duarum linearum PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in zwo Reihen.

Fig. VIII. **ARANEA** oculorum situ duarum linearum SECUNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in zwo Reihen.

Fig. IX. **ARANEA** oculorum situ quatuor linearum SECUNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in vier Reihen.

TABVLA XLIX.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. IX.



Fig. VIII.












Fig. I.




Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



III. TABVLA L.

Fünfzigste Tafel.

- Fig. I. II. LIBELLOIDES PRIMVS. FEMINA.
Erstes Afterjüngferchen. Weibgen.
- Fig. III. LIBELLOIDES SECVNDVS. MAS.
Zweytes Afterjüngferchen. Männgen.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEPTIMVS.
Siebender Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. TENTREDO antennis *setaceis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. BVPRESTIS SEXTA.
Sechster Stinkkäfer.
- Fig. VIII. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Maulwurfskäfer mit drey-spaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit drey-spaltigen Fühlhörnern.
- Fig. X. APIS VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Biene.

ATABVLA LI.

Ein und funfzigste Tafel.

- Fig. I. CARABVS oblongus DECIMVS TERTIVS. *nitens*
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. ASILVS VNDECIMVS.
Eilfte Raubfliege.
- Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis clauatis PRIMVS.
Erster Mehlkäfer mit käulenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. MELOLONTHA SEPTIMA.
Siebender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. COCCINELLA DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA seticornis alis deflexis OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. PHALAENA seticornis alis patentibus SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA seticornis alis deflexis NONA.
Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA II.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.

Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. XII.



TABVLA XIII.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



TABULA XLII.

Zwey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLULA alis patentibus SEXTA.
Sechstes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. VESPA SEPTIMA.
Siebende Wespe.
- Fig. III. NEMOTELVS QVARTVS.
Vierte Stiletfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. APIS VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Biene.
- Fig. VII. CANTHARIS SECVNDA.
Zweyter Pflasterkäfer.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace cylindraceo SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. IX. X. CRIOCERIS QVARTA.
Vierter Lilienkäfer.
- Fig. XI. XII. MELOLONTHA OCTAVA.
Achter Sägenblattkäfer.
- Fig. XIII. MVSCA spathula antennarum rotunda TERTIA.
Dritte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. XIV. ASILVS DVODECIMVS.
Zwölfte Raubfliege.

III. TABVLA LIII.

Die Drey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. HIPPOBOSCA SECUNDA.
Zweyte Pferdfliege.
- Fig. III. NEMOTELVS QVINTVS.
Fünfte Stiletfliege.
- Fig. IV. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS TERTIVS.
Dreyundzwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VESPA OCTAVA.
Achte Wespe.
- Fig. VI. RHINOMACER TERTIVS.
Dritter Afterrüffelkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.
- Fig. VIII. CEROCOMA PRIMA. MAS.
Erster Kronenkäfer. Männchen.
- Fig. IX. CEROCOMA SECUNDA. FEMINA.
Zweyter Kronenkäfer. Weibgen.
- Fig. X. VESPA NONA.
Neunte Wespe.
- Fig. XI. APIS VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Biene.

TABVLA LIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.

Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.





Fig. X.



Fig. XI.







TABULA LIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



Tabula LIV.

Vierund funfzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. MVSCA spathula antennarum *oblonga* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *oblonga* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVARTA.
vierte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VIII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* NONA.
Neunte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IX. MVSCA spathula antennarum *oblonga* DECIMA.
Zehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. X. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. XI. MVSCA spathula antennarum *rotunda* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA LV.

Fünf und funfzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX SEPTIMVS.
Siebender Holzkäfer.
- Fig. II. CERAMBYX OCTAVVS.
Achter Holzkäfer.
- Fig. III. CERAMBYX NONVS.
Neunter Holzkäfer.
- Fig. IV. CERAMBYX DECIMVS.
Zehender Holzkäfer.
- Fig. V. CERAMBYX VNDECIMVS.
Eilfter Holzkäfer.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace cylindraceo SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace plano QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace globofo DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace cylindraceo OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. X. XI. TENTHREDO antennis clauatis SEXTA.
Sechste Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. TENTHREDO antennis clauatis SEPTIMA.
Siebende Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- XIII.

TABVLA LV.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.





TABVLA LVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



TABVLA LVI.

Sechshundfünfzigste Tafel.

Fig. I. **TENTHREDO** *antennis pectinatis* **SECUNDA.**
Zweyte Sägfliede mit gekämmten Fühlhörnern.

Fig. II. **TENTHREDO** *antennis filiformibus* **TERTIA.**
Dritte Sägfliede mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. III. **TENTHREDO** *antennis filiformibus* **QUARTA.**
Vierte Sägfliede mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. IV. **RHINOMACER** **QUARTVS.**
Vierter Afterrüffelkäfer.

Fig. V. VI. **RHINOMACER** **QVINTVS.**
Fünfter Afterrüffelkäfer.

Fig. VII. **RHINOMACER** **SEXTVS.**
Sechster Afterrüffelkäfer.

Fig. VIII. **RHINOMACER** **SEPTIMVS.**
Siebender Afterrüffelkäfer.

Fig. IX. **RHINOMACER** **OCTAVVS.**
Achter Afterrüffelkäfer.

Fig. X. **RHINOMACER** **NONVS.**
Neunter Afterrüffelkäfer.

TABVLA LVII.

Sieben und funfzigste Tafel

- Fig. I. II. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS NONVS.*
Neunzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS NONVS.*
Neunzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS.*
Zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.*
Ein und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS.*
Zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.








Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.




Fig. VIII.




Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



XII TABVLA LVIII.

Acht und funfzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis patentibus TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus* alis integris SECVNDVS.
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis patentibus QVINTA.
Vierter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VII. CANTHARIS TERTIA.
Dritter Pflasterkäfer.
- Fig. VIII. LEPTVRA *thorace conico* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA *thorace conico* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. X. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.

TABVLA LIX.

Neun und funfzigste Tafel.

CANTHARIS QVARTA.

Fig. I. *Vierter Pflasterkäfer.*

STRATIOMYS SEPTIMA.

Fig. II. III. *Siebende Waffenfliege.*

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* OCTAVA.

Fig. IV. V. *Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.*

LEPTVRA thorace *conico* DECIMA QVARTA.

Fig. VI. *Vierzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.*

ARANEA oculorum situ *semilunato* DECIMA.

Fig. VII. *Zehende Spinne mit Augen im halben Monde.*

PHALAENA *seticornis* alis *convolutis* SECUNDA.

Fig. VIII. IX. *Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.*

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig VII.



Fig. VIII.



Fig IX.



TABULA VII.

Fig. III.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. X.



Fig. V.



Fig. II.




Fig. IX.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.





TABVLA LX.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. X.



Fig. IX.



TABVLA LX.

Sechzigste Tafel.

Fig. I. **LIBELLVLA** *alis patentibus* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. **CLERVS** *secvndvs*.
Zweyter Bienenkäfer.

Fig. III. **TENEBRIO** *antennarum articulis lentiformibus* *secvndvs*.
Zweyter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.

Fig. IV. **ICHNEVMON** *vicesimvs sextvs*.
Sechs und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. V. **CVRCVLIO** *femoribus muticis* *decimvs quintvs*.
Funfzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. VI. VII. **PHALAENA** *pedinicornis* *alis deflexis* *nona*.
Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VIII. IX. **PHALAENA** *feticornis* *alis deflexis* *decima*.
Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. X. **CIMEX** *quinque antennarum articulis* *vicesimvs tertivs*.
Drey und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXI.

Ein und fechzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA.

Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON VICESIMVS SEPTIMVS.

Sieben und zanzigste Schlupfwespe

Fig. IV.

ICHNEVMON VICESIMVS OCTAVVS.

Acht und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. V.

ICHNEVMON VICESIMVS NONVS.

Neun und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VI.

ICHNEVMON TRICESIMVS.

Dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. VII.

ICHNEVMON TRICESIMVS PRIMVS.

Ein und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. VIII.

ICHNEVMON TRICESIMVS SECVNDVS.

Zwey und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. IX.

ICHNEVMON TRICESIMVS TERTIVS.

Drey und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. X.

ICHNEVMON TRICESIMVS QVARTVS.

Vier und dreyssigste Schlupfwespe.

TABVLA LXII.

Zwey und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. **LOCVSTA PRIMA.**
Erste Heuschrecke.

Fig. III. IV. **LOCVSTA SECUNDA.**
Zweyte Heuschrecke.

Fig. V. **LOCVSTA TERTIA.**
Dritte Heuschrecke.

Fig. VI. **COCCINELLA DECIMA NONA.**
Neunzehender Blattlauskäfer.

Fig. VII. **MELOLONTHA NONA.**
Neunter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. IX. **TENTHREDO antennis setaceis QUINTA.**
Fünfte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. X. **CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEXTVS.**
Sechzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. XI. **CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEPTIMVS.**
Siebenzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA LXIII.

Drey und fechzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

Fig. II. COPRIS *corniger* PRIMVS. *emarginatus*.
Erster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SECVNDVS. *lunaris*.
Zweyter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* TERTIVS. *Taurus*.
Dritter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. V. COPRIS *corniger* QVARTVS.
Vierter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VI. LEPTVRA *thorace plano* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. VII. PLATYCERVUS SECVNDVS.
Zweyter Kammkäfer.

Fig. VIII. PHALAENA *feticornis* alis patentibus SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



TABULA LXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.




Fig. VI.



Fig. VII.



VXI. TABULA LXIV.

Vier und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. III. LEPTVRA thorace *globoso* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *quadrato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im Vierecke.

VIXI A. TABVLA LXV.

1918 T 00 Fünf und sechzigste Tafel.

CERAMBYX DVODECIMVS.

Fig. I. Zwölfter Holzkäfer.

CRYPTOCEPHALVS NONVS.

Fig. II. Neunter Fallkäfer.

CRYPTOCEPHALVS DECIMVS.

Fig. III. Zehender Fallkäfer.

CRYPTOCEPHALVS VNDECIMVS.

Fig. IV. Eilfter Fallkäfer.

CRYPTOCEPHALVS DVODECIMVS.

Fig. V. Zwölfter Fallkäfer.

CRYPTOCEPHALVS DECIMVS TERTIVS.

Fig. VI. Dreyzehender Fallkäfer.

CHRYSOMELA VICESIMA QVINTA.

Fig. VII. Fünf und zwanzigster Blattkäfer.

CHRYSOMELA VICESIMA SEXTA.

Fig. VIII. Sechs und zwanzigster Blattkäfer.

CHRYSOMELA VICESIMA SEPTIMA.

Fig. IX. Sieben und zwanzigster Blattkäfer.

CHRYSOMELA VICESIMA OCTAVA.

Fig. X. Acht und zwanzigster Blattkäfer.

LEPTVRA thorace conico DECIMA QVINTA.

Fig. XI. Fünfzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



TABULA LXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



IVXII ATabula LXVI.

Sechshundsechzigste Tafel.

Fig. I. *TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus TERTIVS.*
Dritter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.

Fig. II. III. *PHALAENA pectinicornis alis deflexis DODECIMA.*
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. IV. *SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS QVINTVS.*
Fünf und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. V. *SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS SEXTVS.*
Sechs und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

Fig. VI. *CARABVS ovatus SEPTIMVS.* *Sycophanta*
Siebender eyrunder Laufkäfer.

Fig. VII. *CARABVS ovatus OCTAVVS.* *Cypinistatus*
Achter eyrunder Laufkäfer.

Fig. VIII. *PHALAENA feticornis alis deflexis UNDECIMA.*
Eilfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

IV X. TABVLA LXVII.

Sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachem* Brustschilde.
- Fig. III. PRIONVS *SECUNDVS*.
Zweyter Sägenholzkäfer.
- Fig. IV. BVPRESTIS *OCTAVA*.
Achter Stinkkäfer.
- Fig. V. BVPRERTIS *NONA*.
Neunter Stinkkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS *DECIMA*.
Zehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS *VNDECIMA*.
Eilfter Stinkkäfer.
- Fig. VIII. BVPRESTIS *DVODECIMA*.
Zwölfter Stinkkäfer.
- Fig. IX. BVPRESTIS *DECIMA TERTIA*.
Dreyzehender Stinkkäfer.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABULA LXVII.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



X.

Fig. VII.



Fig. VIII.



I.

Fig. X.



Fig. XI.



Fig. IX.




V.

Fig. I.



Fig. II.



TABULA XVI.

Fig. IV.



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. III.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIV.



Fig. XIII.



Fig. XV.



TABULA LXVIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. IV.



Fig. V.



TABVLA LXVIII.

Acht und sechzigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace plano DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA peñinicornis alis planis TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA peñinicornis alis planis QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA spathula antennarum rotunda SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis peñinatis TERTIA.
Dritte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. IX. TENTHREDO antennis clauatis OCTAVA.
Achte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. TENTHREDO antennis clauatis NONA.
Neunte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA LXIX.

Neun und sechzigste Tafel.

- Fig. I. **LEPTVRA** thorace plano VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. **PHALAENA** *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
*Vierzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängen-
 den Flügeln.*
- Fig. IV. V. **SPHINX** alis *integris* cauda *simplici* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. **PHALAENA** *pectinicornis* alis *patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VII. **APIS** VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Biene.
- Fig. VIII. **APIS** TRICESIMA.
Dreysigste Biene.
- Fig. IX. **APIS** TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreysigste Biene.

TABVLA LXX.
Siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis angulatis* SECVNDVS.
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. VESPA DECIMA.
V. Zehende Wespe.

Fig. VI. ICHNEVMON *tricesimus quintus*.
Fünf und dreyßigste Schlupfwespe.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO *antennis pectinatis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.

TABVLA LXXI.

Ein und siebenzigste Tafel.

Fig. I.

SPHINX alis *integris cauda simplici* QUINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. II.

VESPA VNDECIMA.
Eilfte Wespe.

Fig. III.

STAPHYLINVS SEPTIMVS.
Siebender Raubkäfer.

Fig. IV. V.

PHALAENA *pectinicornis alis deflexis* DECIMA QUINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. VI.

MVSCA *spathula antennarum rotunda* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII.

TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA.
Zehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. VIII.

ARANEA *oculorum situ semilunato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



TABVLA LXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXII.

Zwey und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* QUINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschild.
- Fig. IV. ICHNEVMON TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. TABANVS TERTIVS.
Dritte Bremsenfliege.

TABVLA LXXIII.

Drey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. II. COPRIS *corniger* QVINTVS.
Fünfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SEXTVS.
Sechster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* SEPTIMVS.
Siebender gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. V. COPRIS *corniger* OCTAVVS.
Achter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VI. COPRIS *muticus* TERTIVS.
Dritter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* NONA.
Neunte Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum fusiformi* PRIMA.
Erste Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.

Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyssigste Schlupfwespe.

} *Vacca*

Schreberi

Fig. I



TABVLA LXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXIV.

Vier und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. II. **FOMICALEO** SECVNDVS.
Zweyter Ameisenlöwe.

Sordidus

Fig. III. **SCARABAEVS** *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühl-
hörnern.

Fig. IV. **ICHNEVMON** QVADRAGESIMVS.
Vierzigste Schlupfwespe.

Fig. V. **VESPA** DVODECIMA.
Zwölfte Wespe.

flavipes

Fig. VI. **SCARABAEVS** *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühl-
hörnern.

Fig. VII. VIII. **CHRYSIS** SECVNDV.
Zweyte Goldwespe.

TABVLA LXXV.

Fünf und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *PELTIS* SECUNDA.
Zweyter Geißerkäfer.


Fig. IV. *PELTIS* TERTIA.
Dritter Geißerkäfer.

Fig. V. *PELTIS* QUARTA.
Vierter Geißerkäfer.

Fig. VI. *PELTIS* QUINTA.
Fünfter Geißerkäfer.

Fig. VII. *PLATYCERVUS* TERTIVS.
Dritter Kammkäfer.

Fig. VIII. *RHINOMACER* DECIMVS.
Zehender Afterrüßelkäfer.



TABVLA LXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA LXXVI.

Sechs und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. RHINOMACER VNDECIMVS.
Elfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. II. RHINOMACER DVODECIMVS.
Zwölfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. III. RHINOMACER DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* VNDECIMA.
Elfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. NEMOTELVS SEXTVS.
Sechste Stiletfliege.
- Fig. VII. NEMOTELVS SEPTIMVS.
Siebende Stiletfliege.
- Fig. VIII. NEMOTELVS OCTAVVS.
Achte Stiletfliege.
- Fig. IX. NEMOTELVS NONVS.
Neunte Stiletfliege.

TABVLA LXXVII.

Sieben und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. ELATER *antennis setaceis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER *antennis setaceis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. PHALAENA *seticornis alis planis* DYODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. V. MELOLONTHA DECIMA.
Zehender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. DIAPERIS PRIMA.
Erster Herzkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Fallkäfer.
- Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXVIII.
Acht und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. III. BOMBYLIVS SECVNDVS.
Zweyte Rüffelfliege.

Fig. IV. APIS TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyszigste Biene.

Fig. V. APIS TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyszigste Biene.

Fig. VI. ASILVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Räubfliege.

TABVLA LXXIX.

Neun und fiebenzigste Tafel.

Fig. I. **CVRCVLIO** *femoribus muticis* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. II. III. **PAPILIO** *hexapus alis integris* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. **CIMEX** *quinque antennarum articulis* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. V. **BOMBYLIVS** TERTIVS.
Dritte Rüsselfliege.

Fig. VI. **BOMBYLIVS** QVARTVS.
Vierte Rüsselfliege.

Fig. VII. **STENOCORVS** *thorace inermi* SEXTVS.
Sechster Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABULA LXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. I.





Fig. III.



TABULA LXXX. ;

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VII.

TABVLA LXXX.

Achtzigste Tafel.

- Fig. I. **VOLVCELLA SEPTIMA.**
Siebende Federbuschfliege.
- Fig. II. **ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS.**
Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. III. **ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SECVNDVS.**
Zwey und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. **SPHINX alis integris cauda simplici SEPTIMA.**
Siebender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. **PHALAENA feticornis alis planis DECIMA TERTIA.**
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA LXXXI.

Ein und achtzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA.
Zehende Hausfliege mit ründlichem Spadel.

Fig. II. III. SPHEX PRIMA.
Erste Afterwespe.

Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS TERTIVS.
Drey und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. V. CHRYSIS TERTIA.
Dritte Goldwespe.

Fig. VI. VESPA DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Wespe.

Fig. VII. APIS TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyßsigste Biene.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.





Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.

Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. V.

Fig. XI.



Fig. VI.



Fig. XII.



Fig. VIII.




Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. I.




Fig. II.






Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VI.



TABVLA LXXXII.
Zwey und achtzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVARTVS.
Vier und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. IV.

STENOCORVS thorace *inermi* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

Fig. V.

STENOCORVS thorace *armato* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.

Fig. VI.



CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXXXIII.

Drey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* OCTAVVS.
Achter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängen-
den Flügeln.
- Fig. VI. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und vierzigste Schlupfwespe.

TABULA LXXXIV.



TABVLA LXXXIV.

Vier und achtzigste Tafel.

- Fig. I. STENOCORVS thorace *inermi* NONVS.
Neunter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.
- Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS.
Zehender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* VNDECIMVS.
Eilfter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.
- Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* DVODECIMVS.
Zwölfter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS NONVS.
Neun und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IX. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS.
Funfzigste Schlupfwespe.

TABVLA LXXXV.

Fünf und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. SPHEX SECUNDA.
Zweyte Afterwespe.
- Fig. III. STAPHYLINVS OCTAVVS.
Achter Raubkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis planis QVARTA.
Fünfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis planis SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace plano* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. TABANVS QVARTVS.
Vierte Bremsenfliege.

Tabula LXXXVI.

Sechs und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *peñicornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangingen Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *peñicornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangingen Flügeln.

Fig. IV. CICINDELA QUINTA.
Fünfter Zangenkäfer

Fig. V. CLERVS TERTIVS.
Dritter Bienenkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SXTVS.
Sehzehender Fallkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Fallkäfer.

Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Fallkäfer.

CRYPTOCEPHALVS

TABVLA LXXXVII.

Sieben und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum fusiformi* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS NONVS.
Neunzehender Fallkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS.
Zwanzigster Fallkäfer.

Fig. VII. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXXXVIII.

Acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS oblongus DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender länglicher Laufkäfer.

violaceus
purpurascens?

Fig. II. III. BLATTA PRIMA.
Erste Schabe.

Fig. IV. PHALAENA peñinicornis alis planis NONA.
Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. PHALAENA peñinicornis alis planis DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. PANORPA PRIMA.
Erste Scorpionfliege.

Fig. VII. PANORPA SECUNDA.
Zweyte Scorpionfliege

M

Fig. VIII. IVLVS PRIMVS.
Erster Taufendfufs

TABVLA LXXXIX.

Neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. BOMBYLIVS QVINTVS.
Fünfte Rüsselfliege.
- Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. ANTHRIBVS PRIMVS.
Erster Bürstenkäfer.
- Fig. VII. OESTRVS PRIMVS.
Erste Viehfliege.
- Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.




Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VIII.





TABVLA XC.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



TABVLA XC.
Neunzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängen-
den Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängen-
den Flügeln.

Fig. IV. PYROCHORA PRIMA.
Erster Feuerkäfer.

Fig. V. VI. PHRYGANEA QUARTA.
Vierte Frühlingsfliege.

Fig. VII. DITYCVS SEXTVS.
Sechster Schwimmkäfer.

Fig. VIII. IX. CRABRO QUARTVS.
Vierte Kolbenfliege.

TABVLA XCI.

Ein und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. **PAPILIO** *hexapus* *alis integris* **QVARTVS.**
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. **PAPILIO** *tetrapus* *alis integris* **QVINTVS.**
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. **MVSCA** *spathula antennarum rotunda* **VNDECIMA.**
Eilfte Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. V. **VESPA** **DECIMA QVARTA.**
Vierzehende Wespe.

Fig. VI. **LOCVSTA** **QVARTA.**
Vierte Heuschrecke.

Fig. VII. **MVSCA** *spathula antennarum fusiformi* **TERTIA.**
Dritte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.

Fig. VIII. **NEMOTELVS** **DECIMVS.**
Zehende Stiletfliege.

TABVLA XCI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.





Fig. VII.



Fig. VIII






Fig. I.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. V.



TABULA XCII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA XCII.

Zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. **LIBELLVLA** *alis patentibus* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. **PHALAENA** *pectinicornis* *alis deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. III. **PHALAENA** *seticornis* *alis planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. **PHALAENA** *seticornis* *alis deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. VI. **PHALAENA** *pectinicornis* *alis deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. **PHALAENA** *pectinicornis* *alis deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA XCIII.
Drey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis SECUNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit siebenpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreypaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreypaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PELTIS *SEXTA*.
Sechster Geiferkäfer.
- Fig. V. PELTIS *SEPTIMA*.
Siebender Geiferkäfer.
- Fig. VI. PELTIS *OCTAVA*.
Achter Geiferkäfer.
- Fig. VII. PTEROPHORVS *PRIMVS*.
Erster Fächerkäfer.
- Fig. VIII. VESPA *DECIMA QVINTA*.
Fünfzehende Wespe.

TABULA XCIV.

Vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. *NEMOTELVS VNDECIMVS.*
Eilfte Stiletfliege.
- Fig. IV. V. *SPHEX TERTIA.*
Dritte Afterwespe.
- Fig. VI. *LEPTVRA thorace plano DECIMA TERTIA.*
Dreyzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace plano DECIMA QVARTA.*
Vierzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. *LEPTVRA thorace plano DECIMA QVINTA.*
Fünfzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.

TABVLA XCV.

Fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. **RAPHIDIA PRIMA.**
Erste Kameelfliege.
- Fig. II. **RAPHIDIA SECUNDA.**
Zweyte Kameelfliege.
- Fig. III. **CISTELA PRIMA.** *Byrrhus pilula*
Erster Kegelkäfer.
- Fig. IV. **NECYDALIS SECUNDVS.**
Zweyter Fliegenkäfer.
- Fig. V. **NECYDALIS TERTIVS.**
Dritter Fliegenkäfer.
- Fig. VI. **MYLABRIS PRIMA.**
Erster Fühlspitzenkäfer.
- Fig. VII. **MYLABRIS SECUNDA.**
Zweyter Fühlspritzenkäfer.
- Fig. VIII. IX. **PHALAEANA seticornis alis deflexis DECIMA QVARTA.**
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Tabula XCVI.
Sechs und neunzigste Tafel.

- Fig. I. COPRIS *corniger* NONVS. *muchicornis*
Neunter gehörnter Aftermaulwurfkäfer.
- Fig. II. CICADA PRIMA.
Erste Schaumfliege.
- Fig. III. CICADA SECUNDA.
Zweyte Schaumfliege.
- Fig. IV. V. SPHINX *alis integris cauda simplici* OCTAVA.
Achter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. CASSIDA QUINTA.
Fünfter Schildkäfer.
- Fig. VII. CICADA TERTIA.
Dritte Schaumfliege.
- Fig. VIII. CICADA QUARTA.
Vierte Schaumfliege.
- Fig. IX. TENTHREDO *antennis setaceis* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA XCVII.

Sieben und neunzigste Tafel.

NOTONECTA SECUNDA.

Zweyte Wasserwanze.

Fig. I.

CORIXA PRIMA.

Erster Rückenschwimmer.

Fig. II.

PAPILIO *tetrapus* *alis integris* QVINTVS.

Fig. III. IV. *Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.*

PAPILIO *tetrapus* *alis integris* SEXTVS.

Fig. V. VI. *Sechster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.*

PAPILIO *hexapus* *alis integris* SEXTVS.

Fig. VII. *Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.*

PAPILIO *hexapus* *alis integris* SEPTIMVS.

Fig. VIII. IX. *Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.*

PAPILIO *hexapus* *alis integris* OCTAVVS.

Fig. X. XI. *Achter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.*

Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VII.





Fig. I.*Fig. II.**Fig. III.**Fig. V.**Fig. IV.*

TABVLA. XCVIII.

Acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* NONA.
Neunter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanz.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VII. VIII. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. IX. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

TABVLA XCIX.

Neun und neunzigste Tafel.

Fig. I. II.

SPHINX alis *integris* cauda *simplici* DECIMA.

Zehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. III. IV.

SPHINX alis *integris* cauda *simplici* VNDECIMA.

Elfster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. V. VI.

SPHINX alis *angulatis* PRIMA.

Erster Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

TABULA XCIX.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



TABVLA C.

Hunderfte Tafel.

Fig. I. SPHINX alis *angulatis* SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. II. SPHINX alis *angulatis* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis *angulatis* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. SPHINX alis *angulatis* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. VI. SPHINX alis *angulatis* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

THE NEW YORK

Public Library

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway, New York City

Open from 10 A.M. to 5 P.M.

Free admission for all

Gifts and purchases accepted

